Supositorios de Glicerina Fecofar Infantes

Glicerina

10 SUPOSITORIOS
Venta Libre

PROSPECTO

VENTA LIBRE
Industria Argentina

Fórmula:
Cada supositorio contiene: Glicerina 1,64 g; Estearato de sodio c.s.p. 1,82 g.

Acción terapéutica:
Laxante osmótico.

Indicaciones:
Está indicado exclusivamente cuando no pueda utilizarse la vía oral. Para la evacuación del colon antes de estudios radiológicos.

Acción farmacológica:
Estimulante del peristaltismo (movimiento) intestinal, obteniéndose como consecuencia el aumento de la frecuencia de las deposiciones.

Farmacocinética:
La glicerina es un agente osmótico que no se absorbe desde el intestino y es resistente a la digestión.

Posologia y forma de administración:
Puede utilizarse una tijera, para facilitar la extracción del supositorio de su envase.
Antes de cada aplicación verifique en el estuche y en su contenido, que el nombre comercial completo, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Introducir un supositorio en la ampolla rectal y esperar de 15 a 30 minutos.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad a la glicerina.

Advertencias y precauciones:
El abuso en el uso de laxantes puede llevar a dolores abdominales, debilidad, sed, vómitos. Se puede producir una gastroenteropatía perdedora de proteínas y un disbalance hidroelectrolitico. Se desconoce la seguridad de uso de los supositorios de glicerina durante el embarazo y la lactancia. Dado que la constipación puede ser síntoma de supositorios de glicerina. No utilizar este medicamento por más de 3 días ininterrumpidos. Si el síntoma persiste o empeora consultar con un médico. Solo para uso por vía rectal. Ante todo cuadro de constipación reciente no justificado por un cambio en el modo de vida, o acompañado de dolor, fiebre o distensión abdominal, consultar con un médico antes de utilizar este medicamento. No utilizar en presencia de hemorroides, fisura anal o sangrado anal.

Reacciones adversas:
Ocasionalmente irritación (ardor) perianal.

Sobredosificación:
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-6666 / 2247.
Hospital Posadas:
(011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentaciones:
Envases conteniendo 10 supositorios

Conservar en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nº 32.364
Director Técnico: Sergio A. Minguila, Farmacéutico.
Fecha de última revisión: 11/01

Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742
(B1754AZV) San Justo, Pcia. de Buenos Aires.

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.