Ibufec 2% Ibuprofeno pediátrico



8hs

No contiene alcohol

Sin T.A.S.C.

Suspensión Oral
Venta Libre
Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUE CONTIENE IBUFEC 2%?
Cada 100 mililitros contiene:
Ingrediente activo: Ibuprofeno 2,00 gramos.
Ingredientes inactivos: Polisorbato, Sorbato de potasio, Benzoato de sodio, Carboximetil-celulosa sódica, EDTA Disódico, Colorante rojo punzó, Sorbitol, Azúcar, Glicerina, Esencia de frutillas, Esencia de banana, Goma xántica, Agua purificada c.s.p.

ACCION:
Calma el dolor. Baja la fiebre. Disminuye la inflamación.

¿PARA QUE SE USA IBUFEC 2%?
Se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, de dientes y de cabeza, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o malestar general.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUFEC 2%?
No se debe utilizar si la persona es alérgica al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Además las personas con insuficiencia hepática o renal no deben automedicarse con Ibufec 2 %.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica. El tratamiento con ibuprofeno puede alterar algunas pruebas de laboratorio, fundamentalmente, análisis de sangre.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO IBUFEC 2%?
Consulte con su médico en los estos casos si:
- El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.
- Está deshidratado (pèrdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta líquidos.
- En el área dolorida hay enrojecimiento o hinchazón.
- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos.
- El dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.
- Aparecen síntomas nuevos.

Salvo indicación médica:
No combinarlo con otros productos analgésicos y/o antitérmicos.
No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.
No utilizar contra el dolor de estómago.

Hable con su médico o farmacéutico sí:
- Usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo "Infecciones")

Infecciones:
IBUFEC 2% puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que IBUFEC 2% pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado

en neumonía causada por bacterias o infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor de estómago, trastornos digestivos), erupción cutánea, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigos y dolor de cabeza.
Si Ud. toma regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Antes de utilizar este medicamento, verifique en el estuche y en su contenido (frasco), que el nombre comercial, porcentaje, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad. En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.

Tabla de dosificación

Peso	Edad	Dosis
menos de 11	menos de 2 años	Consulte a su médico
11 kg. a 15 kg.	2 a 3 años	5 ml
16kg. a 21 kg.	4 a 5 años	7,5 ml
21 kg. a 27 kg.	6 a 8 años	10 ml
27 kg. a 32 kg.	9 a 10 años	12,5 ml
más de 32 kg.	más de 10 años	15 ml

En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas.
No administrar más de 3 veces al día.

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas
(como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MAS DE LA CANTIDAD NECESARIA?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6506/2247.
Hospital Alejandro Posadas Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata Tel. (0221) 451-5555.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?
LABORATORIOS FECOFAR Tel.: 4482-5517 / 5522.
ANMAT responde 0800-333-1234.

ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Conservar en su envase original a temperaturas inferiores a 30°C.

Medicamento libre de gluten.

PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo 90 ml.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 40.855

LABORATORIOS FECOFAR
Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV, San Justo, Provincia de Buenos Aires

Director Técnico: Sergio A. Minguila, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 01/22

FECOFAR
El valor de nuestra marca

Una vez consumido el contenido y/o cumplida la fecha de vencimiento del producto, desechar en forma responsable.
Cuidar el medioambiente es una responsabilidad de todos.