Ibufec 4% Ibuprofeno pediátrico



6 a 8 hs

Suspensión Oral
Venta Libre
Industria Argentina



LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE IBUFEC 4%?
Cada 100 mililitros contiene:
Ingrediente activo: Ibuprofeno 4,00 gramos.
Ingredientes inactivos: Aerosil, Polisorbato, Sorbato de potasio, Benzoato de sodio, Carboximetilcelulosa sódica, EDTA disódico, Colorante rojo punzó, Sorbitol, Azúcar, Glicerina, Esencia de frutillas, Esencia de banana, Goma xántica, Simeticona, Agua purificada c.s.p.

ACCIÓN
Calma el dolor. Baja la fiebre. Disminuye la inflamación.

¿PARA QUÉ SE USA IBUFEC 4%?
Se utiliza para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, de dientes y de cabeza. Resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado en general.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUFEC 4%?
No use este medicamento si usted es alérgico al Ibuprofeno, a la aspirina, a otros analgésicos antiinflamatorios o a alguno de los ingredientes de a formula.
Las personas con insuficiencia hepática o renal, no deben automedicarse con IBUFEC 4%.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?
Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos.
El Ibuprofeno puede alterar alunas pruebas de laboratorio, fundamentalmente, análisis de sangre.
No use este medicamento y/o consulte a su médico antes de tomar IBUFEC 4% si:
- Está embarazada o dando el pecho a su bebe.
- El niño tiene menos de 2 años.
- Tiene dolor de estómago o abdomen.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO IBUFEC 4%?
Consulte a su médico en estos casos si:
- Se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear medicamentos para bajar la fiebre o para tratar alergias, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, el dolor y/o la fiebre empeoran.
- Está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- En el área dolorida hay enrojecimiento o hinchazón.
- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción de la piel, náuseas y vómitos.
- El dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.
- Aparecen síntomas nuevos.

Salvo indicación médica:
- No combinarlo con otros productos analgésicos y/o antitérmicos.
- No usar más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.
- No utilizar contra el dolor de estómago.

Hable con su médico o farmacéutico sí:
- Usted tiene una infección (por favor lea bajo del subtítulo "Infecciones").

Infecciones:
IBUFEC 4% puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que IBUFEC 4% pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias o infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (nauseas, vómitos, dolor de estómago, trastornos digestivos), erupción cutánea, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigos y dolor de cabeza.

Si ud. toma regularmente otro medicamento, consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Antes de utilizar este medicamento, verifique en el estuche y en su contenido (frasco), que el nombre comercial, porcentaje, lote y fecha de vencimiento sean coincidentes.
Agitar bien el frasco antes de usar.
Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

En niños:
Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible, tomar como referencia la edad.

En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.
Administrar de acuerdo con las indicaciones de la tabla.

Peso (Kilos)	Edad (años)	Dosis (mililitros)
Menos de 11	Menos de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2 a 3	2,5 mililitros
16 a 21	4 a 5	3,75 mililitros
21 a 27	6 a 8	5 mililitros
27 a 32	9 a 10	6,25 mililitros
Más de 32	Más de 10	7,5 mililitros

En caso necesario, repetir la dosis cada 8 horas.
No administrar más de 3 veces al día.

En adultos:
Para calmar el dolor - Bajar la fiebre: 10 mililitros (400 miligramos) cada 6 a 8 horas.
Para disminuir la inflamación: 30 a 80 mililitros por día (1200 a 3200 miligramos por día), dividido en 3 a 4 tomas.
No tomar más de 4 veces por día.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS DE LA CANTIDAD NECESARIA?
Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.
Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6506/2247.
Hospital Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?
LABORATORIOS FECOFAR Tel.: 4482-5517 / 5522.
ANMAT responde 0800-333-1234.

ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO O Y/O FARMACÉUTICO.

Conservar en su envase original a temperatura inferior a 30 °C.

Medicamento Libre de gluten.

PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo 90 ml.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 40.855
Director Técnico: Sergio A. Minguila - Farmacéutico
Fecha de última revisión: 01/22
Laboratorios Fecofar
Av. Pte. J. D. Perón 2742 - B1754AZV - San Justo - Provincia de Buenos Aires

FECOFAR