



BRUST

Brustvergrösserung

Viele Frauen definieren ihre eigene Attraktivität über die Form und Grösse der Brust. Kein anderer Körperteil widerspiegelt die weibliche Sexualität stärker. Oft empfinden Frauen ihre Brust als nicht (mehr) ästhetisch oder begehrenswert. Ihr Selbstwertgefühl vermindert sich entsprechend.



01 Operationstechnik

Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose. Mit einem kleinen Schnitt in der Hautfalte unter der Brust (selten am Rand der Brustwarze oder in der Achselhöhle) kann das Implantat entweder unter den Brustmuskel, unter die Muskelhaut des Brustmuskels oder direkt unter die Brustdrüse eingesetzt werden. Die verwendeten Brustimplantate sind aus kohäsivem Silikongel. Dieses Gel setzt sich aus vernetzten Silikonen zusammen, was ein Auslaufen des Implantats verhindert.

02 Vor der Operation

Auf Medikamente, die blutgerinnungshemmend wirken wie Aspirin, sollten Sie mindestens 14 Tage vor der Operation verzichten. Ebenfalls zu vermeiden sind Schlafmittel, Alkohol und Zigaretten (Nikotin vermindert die Durchblutung der Haut resp. der Organe und verzögert dadurch die Wundheilung). Weitere Hinweise und Abklärungen werden während der Konsultation in der Praxis besprochen.

03 Nach der Operation

Während der Operation können sogenannte Wunddrainage-Röhrchen, die das Blut- und Wundsekret ableiten, eingelegt werden, die je nach Fördermenge nach 24–48 Stunden entfernt werden. In den ersten Tagen tragen Sie einen straff sitzenden, stützenden Brustverband. Ein Sport-BH muss während 6 Wochen Nacht und Tag getragen werden.

04 Komplikationen/Nebenwirkungen

Um das Implantat bildet sich eine zarte, bindegewebartige Hülle (Kapsel). Sehr selten kann aus dieser Hülle eine harte und schmerzhaft Kapselfibrose entstehen. Je nach Dicke des Hautmantels kann die Prothese und im weiteren Verlauf mögliche Fältelung der Prothese durch

eine Kapselfibrose sicht- und tastbar sein. Infektionen, Nachblutungen und Gefühlsstörungen im Bereich der Brustwarze sind mögliche Nebenwirkungen, die aber nur selten auftreten.

AUF EINEN BLICK

Das Wichtigste in Kürze.



Operations-Dauer
1,5 Stunden



Narkose
Vollnarkose



Klinikaufenthalt
1 Nacht



Nachbehandlung
6 Wochen Sport BH, Entfernung der
Pflaster und Fäden nach 2 Wochen.



Sportverbot
4–6 Wochen



Gesellschaftsfähigkeit
nach ca. 1 Woche



Arbeitsunfähigkeit
mind. 1 Woche, je nach Beruf
jedoch auch länger

Bereit für Ihre Beratung?

Wir begleiten Sie persönlich auf dem Weg zu Ihrer Behandlung.

+41 44 201 34 35

doris.strasser@hirslanden.ch
Mo bis Fr, 09:00 bis 17:00 Uhr