

Información sobre medicamentos: Inhibidores del SGLT2



¿Qué son los inhibidores del SGLT2?

Los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 (SGLT2) son medicamentos orales (tomados por la boca) fabricados para tratar la diabetes. También pueden mejorar la salud del corazón y los riñones, incluso si no se padece de diabetes.

Estos medicamentos pueden ayudar a:



- Reducir el nivel de azúcar en sangre (si tiene diabetes)



- Retrasar la progresión de la enfermedad renal



- Reducir el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral
- Evitar la necesidad de hospitalización por insuficiencia cardíaca

Consulte la lista de inhibidores del SGLT2 y sus nombres comerciales a continuación para saber si ya está tomando alguno de estos medicamentos. Algunos inhibidores del SGLT2 pueden combinarse con otros medicamentos para la diabetes.

Lista de inhibidores del SGLT2

- Bexagliflozina / *Bexagliflozin* (Brenzavvy[®])
- Canagliflozina / *Canagliflozin* (Invokana[®])
- Dapagliflozina / *Dapagliflozin* (Farxiga[®])
- Empagliflozina / *Empagliflozin* (Jardiance[®])
- Ertugliflozina / *Ertugliflozin* (Steglatro[®])
- Sotagliflozina / *Sotagliflozin* (Inpefa[®])

Lista de inhibidores del SGLT2 combinados con otros medicamentos para la diabetes

- Canagliflozina + metformina / *Canagliflozin + metformin* (Invokamet[®], Invokamet[®] XR)
- Dapagliflozina + metformina / *Dapagliflozin + metformin* (Xigduo[®] XR)
- Dapagliflozina + saxagliptina / *Dapagliflozin + saxagliptin* (Qtern[®])
- Empagliflozina + linagliptina / *Empagliflozin + linagliptin* (Glyxambi[®])
- Empagliflozina + metformina / *Empagliflozin + metformin* (Synjardy[®], Synjardy[®] XR)
- Empagliflozina + linagliptina + metformina / *Empagliflozin + linagliptin + metformin* (Trijardy[®] XR)
- Ertugliflozina + metformina / *Ertugliflozin + metformin* (Segluromet[®])
- Ertugliflozina + sitagliptina / *Ertugliflozin + sitagliptin* (Steglujan[®])

¿Qué debo saber acerca de tomar un **inhibidor del SGLT2**?



- **Tome su medicamento a la misma hora todos los días.** Muchas personas toman su medicamento al despertarse por la mañana. Trate de no omitir ni saltarse una dosis.
 - » **Sugerencia:** si le resulta difícil acordarse de tomar sus medicamentos, intente utilizar un calendario, un pastillero, una alarma en su teléfono o descargar una aplicación en su teléfono para que le sirva de recordatorio.
- **Estos medicamentos pueden tomarse con o sin alimentos.**
- **Es posible que necesite análisis de sangre** para evaluar cómo está funcionando el medicamento en su cuerpo.
- **Consulte con el médico o farmacéutico** cada vez que comience o deje de tomar un medicamento o suplemento nuevo.
- **Si no puede costear los medicamentos, informe a su médico o al farmacéutico.** Podría calificar para una tarjeta de ahorros que reduzca el costo.
- **Avísele a su médico si no está comiendo o bebiendo** debido a una enfermedad, a un procedimiento médico o una cirugía programados.
- **Informe a su médico si presenta fiebre,** signos de infección fúngica, dolor o ardor al orinar, dolor en la parte inferior del abdomen o la espalda, o aumento de la sed.
- **No suspenda ni modifique** la forma en que toma sus medicamentos sin antes hablar con su médico.

Si tiene diabetes, enfermedad cardíaca o enfermedad renal y no está tomando un inhibidor del SGLT2, pregúntele a su médico si un inhibidor del SGLT2 es adecuado para usted.