

Kdy konzultovat lékaře?

1. Při infekčním onemocnění, zejména provázeném horečkou nebo hnisáním.
2. Při onemocnění s průjmem a zvracením.
3. Při každém vážnějším úrazu nebo před operací.
4. Objeví-li se příznaky nedostatku inzulínu (žízeň, únava, svědění apod.).
5. Objeví-li se opakovaně příznaky hypoglykémie (hlad, pocení, třes, bolesti hlavy, poruchy soustředění apod.).

PRŮKAZ DIABETIKA

Léčím se:



Dietou



PAD*



Inzulínem

Jméno:

bydliště:

ZP:

rodné číslo:

razítka diabetologické ambulance

GluNEO® H glukometr

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Jsem DIABETIK

Při léčbě tabletami nebo inzulínem může dojít ke stavu zmatenosti, útlumu, ospalosti nebo agresivity, někdy připomínající chování v opilosti. Tento stav může být způsoben nízkou hladinou cukru v krvi (hypoglykémie).

Naleznete-li mne v tomto stavu, podejte mi, prosím, sladký nápoj.

Pokud mne najdete v bezvědomí, nepodávejte mi sladký nápoj, protože bych jej mohl (mohla) vdechnout. Zavolejte, prosím, ihned lékaře a informujte ho, že jsem diabetik (diabetička).

novatin 

Novatin s.r.o., V sadech 1081/4a, 160 00 Praha 6, Česká republika
InfoLinka: 800 305 503 • www.novatin.com

*perorální antidiabetikum

GLU/NEO/02/17/2026

GluNEO® H

Nová generace měření hladiny
krevní glukózy

